

口腔执业医师考试：《答疑周刊》2021年第52期

【口腔颌面外科学】

下列关于面部疔痈的治疗方法中，正确的是

- A. 局部热敷
- B. 苯酚、硝酸银烧灼
- C. 高渗盐水纱布局部持续湿敷
- D. 挤压、挑刺，以利于引流
- E. 溃破后立即停止局部湿敷

【正确答案】 C

【答案解析】 疔的局部治疗宜用高渗盐水或含抗菌药物的盐水纱布局部持续湿敷，可促进早期疔的局限、软化和穿破。已溃破或切开引流后，局部仍应以高渗盐水纱布持续湿敷，可收良好的提脓效果，但已脓污的盐水纱布应及时更换，湿敷一般应持续到脓液消失、创面趋于平复为止。过早停止湿敷，可因脓道阻塞而使病情反复加重。

【医学教育网原创】

【口腔颌面外科学】

关于吸入性窒息急救错误的是

- A. 应立即行气管切开术
- B. 悬吊下坠的上颌骨骨块
- C. 充分吸出进入下呼吸道的分泌物及其他异物
- D. 注意防治肺部并发症
- E. 充分吸出进入下呼吸道的血液

【正确答案】 B

【答案解析】 吸入性窒息的急救：应立即行气管切开术，通过气管导管，充分吸出进入下呼吸道的血液、分泌物及其他异物，解除窒息。此类患者要特别注意防治肺部并发症。

【口腔解剖生理学】

下颌小舌是下列哪项结构的附着位置

- A. 茎突舌骨韧带
- B. 颞下颌韧带
- C. 翼下颌韧带
- D. 茎突下颌韧带
- E. 蝶下颌韧带

【医学教育网原创】

【正确答案】 E

【答案解析】 下颌支其内侧面中央略偏后上方有下颌孔；孔的前方有下颌小舌，为蝶下颌韧带附着处。

【口腔解剖生理学】

口腔黏膜的痛觉分布不均匀，以下有关无痛区的相关描述中正确的是

- A. 与第一磨牙相对的颊黏膜区有触觉感受点而无痛觉感受点
- B. 与第一磨牙相对的颊黏膜区有痛觉感受点而无触觉感受点
- C. 与第二磨牙相对的颊黏膜区有痛觉感受点而无触觉感受点
- D. 与第三磨牙相对的颊黏膜区有触觉感受点而无痛觉感受点
- E. 自颊侧黏膜中央至口角的一段带状区痛觉较迟钝

【正确答案】 E

【答案解析】 口腔黏膜的痛觉分布不均匀，与第二磨牙相对的颊黏膜区有触觉感受点而无痛觉感受点，自颊侧黏膜中央至口角的一段带状区痛觉较迟钝，称为无痛区。

【医学教育网原创】