



妇科主治医师考试:《答疑周刊》2019年第21期

问题索引:

一、【问题】请简述引起阴道流血的常见原因有哪些?

二、【问题】请简述临床常见的阴道白带有哪一些?

三、【问题】请简述临床上常见附件肿块有哪些?

四、【问题】请简述外阴瘙痒的原因有哪些?

具体解答:

一、【问题】请简述引起阴道流血的常见原因有哪些?

(1) 卵巢内分泌功能失调: 可引起异常子宫出血。主要包括无排卵性功能失调性子宫出血和排卵性月经失调两类, 另外月经间期卵泡破裂, 雌激素水平短暂下降也可致子宫出血。

(2) 与妊娠有关的子宫出血: 常见的有流产、异位妊娠、葡萄胎、产后胎盘部分残留、胎盘息肉和子宫复旧不全等。

(3) 生殖器炎症: 如阴道炎、急性宫颈炎、宫颈息肉和子宫内膜炎等。

(4) 生殖器肿瘤: 子宫肌瘤是引起阴道流血的常见良性肿瘤, 分泌雌激素的卵巢肿瘤也可引起阴道流血。其他几乎均为恶性肿瘤, 包括阴道癌、子宫颈癌、子宫内膜癌、子宫肉瘤、妊娠滋养细胞肿瘤、输卵管癌等。

(5) 损伤、异物和外源性性激素: 生殖道创伤如阴道骑跨伤、性交所致处女膜或阴道损伤, 放置宫内节育器, 幼女阴道内放入异物等均可引起出血。雌激素或孕激素(包括含性激素保健品)药物可引起“突破性出血”。

(6) 与全身疾病有关的阴道流血: 如血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血、白血病、肝功能损害等, 均可导致子宫出血。

二、【问题】请简述临床常见的阴道白带有哪一些?

1. 透明黏性白带 外观与正常白带相似, 但数量显著增多, 应考虑卵巢功能失调、阴道腺病或宫颈高分化腺癌等疾病的可能。

2. 灰黄色或黄白色泡沫状稀薄白带 为滴虫阴道炎的特征, 可伴外阴瘙痒。

3. 凝乳块状或豆渣样白带 为假丝酵母菌阴道炎的特征, 常伴严重外阴瘙痒或灼痛。

4. 灰白色匀质鱼腥味白带 常见于细菌性阴道病, 伴外阴轻度瘙痒。



5. 脓性白带 色黄或黄绿, 黏稠, 多有臭味, 为细菌感染所致。可见于淋病奈瑟菌阴道炎、急性宫颈炎及子宫颈炎管炎。阴道癌或子宫颈癌并发感染、宫腔积脓或阴道内异物残留等也可导致脓性白带

6. 血性白带 白带中混有血液, 血量多少不一, 应考虑子宫颈癌、子宫内膜癌、宫颈息肉、宫颈柱状上皮异位合并感染或子宫黏膜下肌瘤等。放置宫内节育器亦可引起血性白带。

7. 水样白带 持续流出淘米水样白带且具奇臭者, 一般为晚期子宫颈癌、阴道癌或黏膜下肌瘤伴感染。间断性排出清澈、黄红色或红色水样白带, 应考虑输卵管癌的可能。

三、【问题】请简述临床上常见附件肿块有哪些?

附件包括输卵管和卵巢。输卵管和卵巢通常不能扪及。当附件出现肿块时, 多属病理现象。临床常见的附件肿块有:

(1) 输卵管妊娠: 肿块位于子宫旁, 大小、形状不一, 有明显触痛。患者多有短期停经史, 随后出现阴道持续少量流血及腹痛。

(2) 附件炎性肿块: 肿块多为双侧性, 位于子宫两旁, 与子宫有粘连, 压痛明显。急性附件炎症患者有发热、腹痛。慢性附件炎性疾病患者, 多有不育及下腹隐痛史, 甚至出现反复急性盆腔炎症发作。

(3) 卵巢子宫内膜异位囊肿: 多为与子宫有粘连、活动受限、有压痛的囊性肿块, 可有继发性痛经、性交痛、不孕等病史。

(4) 卵巢非赘生性囊肿: 多为单侧、可活动的囊性包块, 直径通常不超过 8cm。黄体囊肿可出现于早期妊娠。葡萄胎常并发一侧或双侧卵巢黄素囊肿。输卵管卵巢囊肿常有不孕或盆腔感染病史, 附件区囊性块物, 可有触痛, 边界清或不清, 活动受限。

(5) 卵巢赘生性肿块: 不论肿块大小, 其表面光滑、囊性且可活动者, 多为良性肿瘤。肿块为实性, 表面不规则, 活动受限, 特别是盆腔内扪及其他结节或伴有胃肠道症状者, 多为卵巢恶性肿瘤。

四、【问题】请简述外阴瘙痒的原因有哪些?

(1) 局部原因: 外阴阴道假丝酵母菌病和滴虫阴道炎是引起外阴瘙痒最常见的原因。细菌性阴道病、萎缩性阴道炎、阴虱、疥疮、蛲虫病、寻常疣、疱疹、湿

疹、外阴鳞状上皮增生，药物过敏或护肤品刺激及不良卫生习惯等，也常是引起外阴瘙痒的原因。

(2) 全身原因：糖尿病、黄疸、维生素 A、B 族缺乏、重度贫血、白血病、妊娠期肝内胆汁淤积症等。

除局部原因和全身原因外，还有不明原因的外阴瘙痒。



妇科主治医师考试：《答疑周刊》2019 年第 21 期（word 版下载）

〔医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任〕

