

【牙体牙髓病学】

下列有关釉质发育不全的防治的说法中, 不正确的是

- A. 轻症患牙不必治疗
- B. 患牙补充维生素 D 和矿物质
- C. 由于患牙发育矿化较差, 容易磨耗
- D. 注意妇幼保健, 可预防本病发生
- E. 重症患牙用复合树脂或用口腔修复学的方法覆盖牙面

【正确答案】 B

【答案解析】 对这类患牙再补充维生素 D 和矿物质, 是毫无意义的。

- ①注意妇幼保健, 可预防本病发生。
- ②由于患牙发育矿化较差, 容易磨耗。患龋后发展较快, 应进行防龋处理。
- ③轻症患牙不必治疗; 重症患牙用复合树脂或用口腔修复学的方法覆盖牙面, 不仅可改善外观, 而且有助于防止龋病的发生。

【牙体牙髓病学】

关于完全脱位牙的叙述正确的是

- A. 在 1 小时内进行再植, 90%可避免发生牙根吸收
- B. 脱位在 2 小时以后再就诊, 牙周膜有可能重建
- C. 年轻完全脱位的恒牙, 若拖延就诊时间, 也可以获得较好预后
- D. 根尖发育完全的脱位牙, 及时复位 3~4 周后再进行根管治疗术
- E. 被污染的完全脱位牙, 可以进行干藏

【正确答案】 D

【答案解析】 完全脱位牙在 0.5 小时内进行再植, 90%患牙的可避免发生牙根吸收。如牙齿已落地污染, 不能即刻复位, 可将患牙置于患者的舌下或口腔前庭处, 也可放在盛有牛奶、生理盐水或自来水的杯子内, 切忌干藏。根尖发育完全的脱位牙, 若就诊迅速或复位及时, 应在术后 3~4 周再做根管治疗术。如果脱位在 2 小时以后再就诊者, 牙髓和牙周膜内细胞已坏死, 不可能期望牙周膜重建。年轻恒牙完全脱位, 若就诊迅速或自行复位及时者, 牙髓常能继续生存, 不要贸然拔髓, 一般疗效是良好的。

【儿童口腔医学】

针对年轻恒牙牙髓炎的治疗原则是

- A. 根管治疗
- B. 根尖手术
- C. 根尖诱导成形术
- D. 尽量保髓治疗

E. 拔除

【正确答案】 D

【答案解析】 年轻恒牙牙髓治疗的原则是: 尽力保存活髓组织, 以保证牙根的继续发育和生理性牙本质的形成。如不能保存全部活髓, 也应该保存根部活髓, 如不能保存根部活髓, 也应该保存牙齿。而根尖诱导成形术是针对于年轻恒牙的根尖周疾病采取的治疗措施。

【儿童口腔医学】

诊断慢性根尖周炎或慢性根尖周炎急性发作的重要指标

- A. X 线片检查可见根尖部和根分歧部牙槽骨破坏的透射影像
- B. 乳牙牙周组织疏松
- C. 患牙松动并有叩痛
- D. 出现较剧烈的自发痛
- E. 根尖部或根分歧处牙龈红肿

【正确答案】 A

【答案解析】 X 线片检查可见根尖部和根分歧部牙槽骨破坏的透射影像, 是诊断慢性根尖周炎或慢性根尖周炎急性发作的重要指标。急性根尖周炎时 X 线片根尖部无明显改变或仅有牙周间隙增宽现象。另外 X 线片检查中, 还需注意牙囊骨壁和恒牙胚是否受损。

