

临床助理医师考试: 《答疑周刊》2020年第50期

【女性生殖系统】

1. 36岁, 初产妇, 孕37周, 头胀头痛, 下肢浮肿已3天, 突发持续性剧烈腹痛3小时入院。体检: 贫血貌, 血压20/13.3kPa (150/100mmHg), 脉搏110次/分, 宫高37cm, 腹围102cm, 子宫不放松, 压痛可疑, 胎位不清, 胎心音听不清, 肛查时发现阴道少量流血, 宫颈管未消失, 宫口未开。

(1) 下列诊断哪项可排除

- A. 孕37周, 死胎可能
- B. 重度子痫前期
- C. 高龄初产妇
- D. 胎盘早剥
- E. 高张性宫缩乏力

【正确答案】E

【答案解析】妊高征+突发腹部剧痛=胎盘早剥

(2) 为尽快明确诊断, 下述哪项辅助检查应优先考虑

- A. B超
- B. 血常规
- C. 阴道检查
- D. 胎心监护
- E. 胎儿生物物理评分

【正确答案】A

【答案解析】首选B超明确诊断。

(3) 其处理应首先考虑下列哪项

- A. 25%硫酸镁 5g 静滴
- B. 静滴催产素引产
- C. 剖宫产终止妊娠
- D. 等待自然分娩
- E. 根据胎儿情况决定分娩方式及终止妊娠时间

【正确答案】C

【答案解析】本例高度怀疑胎盘早剥，考虑产妇失血已很多，产妇宫口未开，所以最好的办法是剖宫产终止妊娠。

2. 初孕妇，妊娠 39 周。剧烈持续腹痛 4 小时入院，贫血貌，血压 130/80mmHg，脉搏 120 次/分，子宫硬，不松弛，有局限性压痛，胎位不清，胎心 110 次/分，阴道少量流血，肛查宫口未开。

(1) 可能的诊断是

- A. 前置胎盘
- B. 子痫前期
- C. 继发性贫血
- D. 低张性子宫收缩乏力
- E. 胎盘早剥

【正确答案】E

【答案解析】剧烈持续腹痛，贫血貌，脉搏快，子宫硬，不松弛，有局限性压痛，胎位不清，胎心减慢，阴道少量流血，均为胎盘早剥的典型症状。

(2) 为明确诊断，最有价值的辅助检查是

- A. 胎心监护
- B. 阴道检查
- C. B 超
- D. 红细胞计数及血红蛋白值
- E. 血白细胞计数及分类

【正确答案】C

【答案解析】胎盘早剥与子宫先兆破裂鉴别要点，胎盘早剥常有妊娠高血压疾病病史，子宫硬如板，胎位不清，无病理缩复环，B 超可见胎盘后血肿。

(3) 此时最正确的处理应是

- A. 输血输液
- B. 静脉滴注缩宫素引产
- C. 给予镇静药等待产程发动
- D. 剖宫产结束分娩
- E. 以上都不是

【正确答案】D

【答案解析】胎盘早剥一般选用剖宫产结束分娩，因剖宫产是快速终止妊娠、抢救母儿生命的有效措施。

3. 受精发生在排卵后

- A. 6 小时内
- B. 8 小时内
- C. 10 小时内
- D. 数小时
- E. 14 小时内

【正确答案】D

【答案解析】卵巢排出的卵子（次级卵母细胞）在输卵管壶腹部与峡部连接处与获能的精子结合，其过程称为受精。受精多数在排卵后数小时发生，一般不超过 24 小时。

4. 40 岁妇女，近 3 日白带多，伴外阴痒就诊，查外阴黏膜充血，阴道壁充血，分泌物黄绿色，有臭味，中等量，呈泡沫状，宫颈充血。

(1) 此病人应进行的辅助检查是

- A. 血常规
- B. 尿常规
- C. 阴道分泌物细菌培养及药敏试验
- D. 悬滴法阴道分泌物查滴虫
- E. 阴道细胞学检查

【正确答案】D

【答案解析】本例白带呈泡沫状，是滴虫性阴道炎的典型白带特征。故首选辅助检查是悬滴法阴道分泌物查滴虫。答案选 D。

(2) 应采取的措施是

- A. 全身及局部同时用药效果最佳
- B. 使用碱性液冲洗阴道可提高疗效
- C. 男方不易感染，无需用药治疗
- D. 局部用药即可达治愈

E. 症状消失复查分泌物转阴即停药

【正确答案】A

【答案解析】患者诊断为滴虫性阴道炎，应该给予全身及局部同时用药，主要治疗药物为抗滴虫药物甲硝唑。