

医学教育网护士执业资格：《答疑周刊》2022年第37期

问题索引：

1. 【问题】肝性脑病是严格禁食蛋白质吗？
2. 【问题】心肌梗死患者行溶栓疗法的禁忌证有哪些？
3. 【问题】使用溶栓疗法后，判断血栓溶解的指标有哪些？
4. 【问题】心肌梗死后出现心律失常，常用的治疗药物有什么？
5. 【问题】心脏瓣膜病最常累及的瓣膜是什么？有什么表现？

具体解答：

1. 【问题】肝性脑病是严格禁食蛋白质吗？

【解答】不是的，肝性脑病禁食蛋白质是因为蛋白质在肠道内分解会导致氨升高，加重肝性脑病，[医学教育网原创]但长时间限制蛋白质会加重营养不良，负氮平衡时会增加骨骼肌的动员，反而使血氨升高，所以治疗肝性脑病的根本要点是保持正氮平衡，限制蛋白质只是一种措施。

2. 【问题】心肌梗死患者行溶栓疗法的禁忌证有哪些？

【解答】溶栓疗法禁忌证有：①既往病史中有出血性脑卒中；②1年内有过缺血性脑卒中、脑血管病；③颅内肿瘤；④近1个月有过内脏出血或已知出血倾向；⑤正在使用抗凝药；[医学教育网原创]⑥近1个月有创伤史、>10分钟的心肺复苏；近3周来有外科手术史；近2周内有不压迫部位的大血管穿刺术；⑦未控制高血压>180/110mmHg；⑧未排除主动脉夹层。

3. 【问题】使用溶栓疗法后，判断血栓溶解的指标有哪些？

【解答】血栓溶解指标：①抬高的ST段2小时内回落大于50%；②2小时内胸痛消失；③2小时内出现再灌注性心律失常；④血清肌酸激酶同工酶（CK-MB）峰值提前出现；⑤也可根据冠状动脉造影直接判断溶栓是否成功。

4. 【问题】心肌梗死后出现心律失常，常用的治疗药物有什么？

【解答】室性心律失常立即给予利多卡因；心室颤动立即行电复律；房室传

导阻滞缓慢者，可用阿托品、异丙肾上腺素，严重者需安装人工心脏起搏器。

5. 【问题】心脏瓣膜病最常累及的瓣膜是什么？有什么表现？

【解答】心脏瓣膜病最常累及的瓣膜是二尖瓣，其次是主动脉瓣。

二尖瓣狭窄时最常出现的早期症状是劳力性呼吸困难，伴有咳嗽，随病情加重，可出现阵发性夜间呼吸困难，[医学教育网原创]严重时可导致肺水肿；患者出现面部两颧绀红、口唇轻度发绀，称“二尖瓣面容”；心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音。

