

口腔执业助理医师：《答疑周刊》2022年第14期

问题索引：

1. 牙周病进展期的病理变化包括哪些？
2. 扁平苔藓病理表现是什么？
3. 容易导致医患交往障碍的因素有什么？
4. 医患关系的模式有哪些？

具体解答：

1. 牙周病进展期的病理变化包括哪些？

结合上皮下方的胶原纤维水肿、变性、消失，是以下哪项病理表现

- A. 牙周炎始发期
- B. 牙周炎早期
- C. 病损确立期
- D. 进展期
- E. 牙龈炎期

【正确答案】D

【答案解析】牙周炎进展期的病理变化包括沟内上皮及结合上皮下方的胶原纤维水肿、变性、消失，大部分已被炎症细胞取代，牙槽嵴顶骨吸收明显这一特点。[医学教育网原创]

2. 扁平苔藓病理表现是什么？

下列哪项不是扁平苔藓的病理变化

- A. 上皮增生或萎缩
- B. 上皮棘层松解
- C. 上皮基底细胞液化
- D. 上皮钉突增生呈锯齿状
- E. 上皮下淋巴细胞呈带状浸润

【正确答案】B

【答案解析】扁平苔藓镜下所见：在黏膜的白色条纹处，上皮有不全角化层；在黏膜发红区则无上皮角化。棘层增生者较多，也可见棘层萎缩。上皮钉突不规

则延长,少数钉突尖端变成锯齿状。基底细胞层液化变性,因此基底细胞排列紊乱,基底膜界限不清,液化明显者可出现上皮下疱。固有层见淋巴细胞浸润带,浸润范围一般不达到黏膜下层。在上皮的棘层、基底层或固有层可见胶样小体或称 Civatte 小体,呈圆形或卵圆形,平均直径为 $10\mu\text{m}$,为均质嗜酸性,PAS 染色阳性。其来源可能是细胞凋亡的一种产物。天疱疮最主要的病理变化是棘层松解。[医学教育网原创]

3. 容易导致医患交往障碍的因素有什么?

下列情况不易导致医患交往障碍的是

- A. 医生对病人的病痛缺乏应有的同情和责任感
- B. 以对方能否带来物质利益而确定关系的好坏
- C. 病人情绪不稳,容易激惹,反应敏感
- D. 病人过分挑剔或过分冷淡
- E. 医生耐心解释病情

【正确答案】E

【答案解析】影响医患关系的因素有很多,包括医患之间缺乏信任和理解,部分医生更多考虑医疗机构和自身的利益,以及病人本身对医生的缺乏理解,不了解医学和疾病的复杂性等。但医生耐心解释病情不会导致医患交往困难。[医学教育网原创]

4. 医患关系的模式有哪些?

以下关于共同参与型医患关系的描述中,正确的是

- A. 医生是主动的,处权威地位,病人完全按医生的要求去做
- B. 医生是主角,病人是配角
- C. 患者在医师指导下自己治疗
- D. 医生的作用占优势,同时有限度地调动病人的主动性
- E. 医生病人都是主动积极参与者

【正确答案】E

【答案解析】共同参与型这是一种双向性的,以生物心理社会医学模式为指导思想的医患关系,其特征是“医生帮助病人自我恢复”,医患双方的关系建立在平等基础上,双方有近似相等的权利和地位,共同参与医疗决策和实施过程,

相互尊重、相互依赖。这种模式主要适用于慢性疾病的治疗，因为这些病人自身的经验常常为治疗提供了重要的线索，即所谓“久病成良医”，而医生只起一种指导性的辅助作用，帮助病人自我治疗。在这种医患关系模式中，病人的主观能动性得到充分的发挥，尤其是医患双方在知识水平、受教育的程度和生活阅历上越接近，这种医患关系模式就越适合。[医学教育网原创]



正保医学教育网
www.med66.com