

2022 年妇产科主治医师必备考点 (21-30)

【考点 21】着床

约在受精后第 6~7 天，晚期囊胚透明带消失之后开始着床。

【考点 22】脐带的静脉

脐带是连接胎儿与胎盘的条索状结构，脐带外覆羊膜，内含一条脐静脉和两条脐动脉。

【考点 23】妊娠后子宫的变化

妊娠 12 周以后，子宫均匀对称增大并超出盆腔，妊娠晚期的子宫常有不同程度右旋。子宫腔容量增加 1000 倍，子宫重量增加 20 倍。

【考点 24】子宫下段

妊娠 12 周以后，子宫峡部逐渐伸展拉长变薄，扩展成为子宫腔的一部分，形成子宫下段，临产后可伸展至 7~10cm。

【考点 25】停经

停经是已婚妇女可能妊娠最早与最重要的症状。

【考点 26】黑加征

妊娠可发现宫颈变软，子宫峡部极软，感觉宫颈与宫体似不相连，称为黑加征（Hegar sign）。

【考点 27】妊娠子宫变化

随妊娠进展，子宫体增大变软，妊娠 8 周子宫体约为非孕子宫体的 2 倍，妊娠 12 周时约为非孕子宫体的 3 倍。

【考点 28】预产期

预产期推算方法是按末次月经第 1 日算起，月份减 3 或加 9，日数加 7。

【考点 29】坐骨结节间径、出口后矢状径

坐骨结节间径（或出口横径）：孕妇取仰卧位，两腿弯曲，双手抱双膝，测量两侧坐骨结节前端内侧缘的距离，正常值为 8.5~9.5cm。若此径值小于 8cm 时，应测量出口后矢状径。出口后矢状径：为坐骨结节间径中点至骶骨尖端的长度。正常值为 8~9cm。出口后矢状径值与坐骨结节间径值之和 > 15cm 时，表明骨盆出口无明显狭窄。

【考点 30】坐骨棘间径

坐骨棘间径：用示指和中指触摸两侧坐骨棘，估计其间距离可容纳 6 指即属正常，正常

值约 10cm。

