

医学教育网临床助理医师考试:《答疑周刊》2022年第35期

女性生殖系统在医师考试中属于分数多、有些难度的科目,异常分娩占到了很大的分值,今天通过几道产力异常的题目来回顾相应的知识点。

问题索引:

1. 子宫收缩过强的临床特点有哪些?
2. 痉挛性狭窄环的临床表现有哪些?
3. 不协调性子宫收缩乏力,为使其恢复极性,应给予什么药物进行处理?

具体解答:

1. 下列哪项不是子宫收缩过强的临床特点

- A. 持续性腹痛、拒按
- B. 病理性缩复环
- C. 血尿
- D. 子宫痉挛性狭窄环
- E. 指压宫底凹陷

【正确答案】 E

【答案解析】 E选项为子宫收缩乏力的特点。[医学教育网原创]

2. 下列哪项符合痉挛性狭窄环的临床表现

- A. 处于子宫上、下段交界处,不协调性子宫收缩过强
- B. 环常围绕胎儿较大部位
- C. 常由于过多阴道操作所致
- D. 一般不会导致产程停滞
- E. 是子宫破裂先兆

【正确答案】 A

【答案解析】 子宫痉挛性狭窄环:子宫壁局部肌肉呈痉挛性不协调性收缩形成的环状狭窄,持续不放松。①产妇持续性腹痛,烦躁不安;②宫颈扩张缓慢;③胎先露部下降停滞;④胎心时快时慢;⑤狭窄环形成:阴道检查在宫腔内触及不

随宫缩上升的较硬无弹性的狭窄环。子宫痉挛性狭窄环多发生在宫颈、宫体的任何部分，多在子宫上下段交界处，属于不协调性子宫收缩过强。所以选 A。[医学教育网原创]

3. 不协调性子宫收缩乏力，为使其恢复极性，应给予

- A. 剖宫产
- B. 静脉滴注催产素
- C. 肌注杜冷丁
- D. 手术破膜
- E. 以上都不是

【正确答案】 C

【答案解析】 不协调性宫缩乏力是禁用催产素的。

不协调性宫缩乏力处理原则是调节子宫收缩，恢复其极性。给予强镇静剂哌替啶 100mg、吗啡 10mg 肌注肌内注射，使产妇充分休息，醒后不协调性宫缩多能恢复为协调性宫缩。在宫缩恢复为协调性之前，严禁应用缩宫素。[医学教育网原创]

正保医学教育网
www.med66.com