

医学教育网执业中药师: 《答疑周刊》2022年第45期

问题索引:

1. 骨伤科常用中成药主要有哪些?
2. 七厘散的注意事项是什么?
3. 接骨丸的注意事项是什么?
4. 云南白药的注意事项是什么?

具体解答:

1. 骨伤科常用中成药主要有哪些?

主要有接骨续伤剂和化瘀止痛剂。

(1) 接骨续伤剂

中成药	功能	主治	注意事项
接骨七厘片	活血化瘀，接骨续筋	跌打损伤，闪腰岔气，骨折筋伤，瘀血肿痛	-
接骨丸	活血散瘀，消肿止痛	跌打损伤，闪腰岔气，筋伤骨折，瘀血肿痛	含马钱子粉有大毒，故应在医生指导下使用。孕妇禁用

(2) 化瘀止痛剂

中成药	功能	主治	注意事项
七厘散	化瘀消肿，止痛止血	跌仆损伤，血瘀疼痛，外伤出血	含朱砂。孕妇禁用
云南白药	化瘀止血，活血止痛，解毒消肿	跌打损伤，瘀血肿痛，吐血，咳血，便血，痔血，崩漏下血，疮疡肿毒及软组织挫伤，闭合性骨折，支气管扩张及肺结核咳血，溃疡病出血，以及皮肤感染性疾病	孕妇忌用。妇女月经期及哺乳期慎用。运动员慎用。过敏体质及有用本品过敏史者慎用。服药1日内，忌食蚕豆、鱼类及酸冷食物。外用前必须清洁创面。用药后如出现过敏反应，应立即停用
跌打丸	活血散瘀，消肿止痛	跌打损伤，筋断骨折，瘀血肿痛，闪腰岔气	孕妇禁用。饭后服用可减轻肠胃反应，脾胃虚弱者慎用

舒筋活血片	舒筋活络，活血散瘀	筋骨疼痛，肢体拘挛，腰背酸痛，跌打损伤	孕妇忌服。对本品及所含成分过敏者禁用。过敏体质者慎用。妇女月经期慎服。因所用的香加皮含强心苷而有毒，故不宜过量或持久服，禁与含强心苷类的西药同用
活血止痛散	活血散瘀，消肿止痛	跌打损伤，瘀血肿痛	孕妇禁用。宜在饭后半小时服用。脾胃虚弱者慎用。不宜大剂量使用。妇女月经期及哺乳期慎用

2. 七厘散的注意事项是什么？

因内含有毒的朱砂而不能过量或长期服用的成药是

- A. 七厘散
- B. 跌打丸
- C. 接骨丸
- D. 活血止痛散
- E. 接骨七厘片

【答案】A

【解析】七厘散的药物组成：血竭、乳香（制）、没药（制）、红花、儿茶、冰片、人工麝香、朱砂。七厘散含有朱砂不宜过量或长期服用。简记参考：诛杀妻离子散。[正保医学教育网原创]

3. 接骨丸的注意事项是什么？

因含有剧毒的马钱子粉而不能过量或持久服用的成药是

- A. 七厘散
- B. 跌打丸
- C. 接骨丸
- D. 舒筋活血片
- E. 接骨七厘片

【答案】C

【解析】接骨丸【注意事项】本品所含马钱子粉有大毒，故应在医生指导下使用。孕妇禁用。骨折、脱臼者应先复位后再用本品治疗。切勿过量或持久服用。
[正保医学教育网原创]简记参考：摔下马骨折，对应接骨丸含有马钱子粉。

4. 云南白药的注意事项是什么？

云南白药的注意事项有

- A. 孕妇忌用
- B. 运动员慎用
- C. 过敏体质慎用
- D. 妇女月经期慎用
- E. 服药期间禁食蚕豆

【答案】ABCDE

【解析】云南白药【注意事项】孕妇忌用。妇女月经期及哺乳期慎用。运动员慎用。过敏体质及有用本品过敏史者慎用。服药 1 日内，忌食蚕豆、鱼类及酸冷食物。外用前必须清洁创面。用药后如出现过敏反应，应立即停用，并视症状轻重给予抗过敏治疗，若外用可先清除药物。注意下是孕妇忌用而非禁用。

正保医学教育网
www.med66.com