

医学教育网护士执业资格: 《答疑周刊》2023年第4期

问题索引:

1. 【问题】护理问题的排列顺序是什么?
2. 【问题】常用防腐剂的作用及用法?
3. 【问题】列举化疗药物副作用?
4. 【问题】常用防腐剂的作用及用法?

具体解答:

1. 【问题】护理问题的排列顺序是什么?

【解答】1) 首优问题: 直接威胁护理对象的生命, 需要立即采取行动的问题。

2) 中优问题: 不直接威胁护理对象的生命, 但能造成躯体或精神上的损害的问题。

3) 次优问题: 人们在应对发展和生活中的变化所产生的问题, 在护理过程中, 可稍后解决。

2. 【问题】病理性缩复环和生理性缩复环的区别?

【解答】子宫病理性缩复环: 因胎先露部下降受阻, 子宫收缩过强, 强有力的宫缩使子宫下段肌肉拉长变薄, 而子宫体部肌肉增厚变短, 两者间形成明显的环状凹陷, 此凹陷逐渐上升达脐部或脐部以上, 压痛明显, 称为病理性缩复环。它是子宫破裂的先兆。

子宫生理性缩复环: 子宫下段由非孕时约 1cm 的子宫峡部伸展形成。妊娠 12 周后峡部已扩展成宫腔的一部分, 妊娠末期被渐拉长形成子宫下段。临产后拉长达 7~10cm。由于子宫肌纤维的缩复作用, 子宫上下段的肌壁厚薄不同, 在两者之间子宫内面形成一环状隆起, 称生理性缩复环。

3. 【问题】列举化疗药物副作用?

【解答】

长春新碱

能引起末梢神经炎、手足麻木感, 停药后可逐渐消失

柔红霉素、高三尖杉酯碱类药物	可引起心肌及心脏传导损害, 用药时要缓慢静滴, 注意听心率、心律, 复查心电图
甲氨蝶呤	可引起口腔黏膜溃疡, 可用 0.5% 普鲁卡因含漱, 减轻疼痛, 便于进食和休息
环磷酰胺	可引起脱发及出血性膀胱炎所致血尿, 嘱病人多饮水, 有血尿必须停药

#### 4. 【问题】常用防腐剂的作用及用法?

##### 【解答】

常用防腐剂的作用及用法			
名称	作用	用法	临床应用
甲醛	固定尿液中有机成分, 防腐	每 100ml 尿液中加 400mg/L 甲醛 0.5ml	艾迪计数
浓盐酸	使尿液保持在酸性环境中, 防止尿液中激素被氧化, 防腐	24 小时尿液中加 10ml/L 浓盐酸	17-羟类固醇、17-酮类固醇
甲苯	可形成一薄膜覆盖于尿液表面, 防止细菌污染, 以保持尿液的化学成分不变	应在第一次尿液倒入后再加, 按每 100ml 尿液加 0.5ml 甲苯 (甲苯浓度为 5~20ml/L)	尿蛋白定量、尿糖定量及钾、钠、氯、肌酐、肌酸定量