

医学教育网主管药师:《答疑周刊》2023年第15期

问题索引:

1. 【问题】不良反应的处置是什么？
2. 【问题】根据半衰期制定的给药方案是什么？
3. 【问题】各种不良反应考点是什么？

具体解答:**1. 【问题】不良反应的处置是什么？**

| 不良反应 | 处置方法 |
|----------|-------------------------------------|
| 便秘 | 增加饮食中纤维的含量；喝大量的水*，运动* |
| 出汗减少 | 避免在阳光下或炎热的环境中工作或运动 |
| 腹泻 | 喝大量的水以补充丢失的水分；若腹泻持续超过3天，应去看医生 |
| 眩晕 | 避免操纵有潜在危险的设备或驾驶车辆 |
| 嗜睡 | 避免操纵有潜在危险的设备或驾驶车辆 |
| 口干 | 吸吮糖果或冰块，或嚼无糖型口香糖 |
| 鼻子和喉咙发干 | 使用加湿器或雾化器 |
| 液体潴留（轻度） | 食物中不要放盐；若可能，将腿抬高 |
| 头痛 | 保持安静；服用阿司匹林*或对乙酰氨基酚* |
| 失眠 | 每天提早服用最后一剂药物*；睡时饮用一杯热牛奶；询问医生有关运动的方案 |
| 发痒 | 经常洗澡或淋浴，或湿敷 |
| 鼻腔充血 | 若需要，使用滴鼻剂 |
| 心悸（轻度） | 经常休息；避免紧张；不要喝咖啡、茶或可乐；戒烟 |
| 胃部不适 | 药物与牛奶或食物同服* |

2. 【问题】根据半衰期制定的给药方案是什么？

| 半衰期 | 给药方案 | |
|------------|----------------------------------|--------------------------|
| <30 分钟 | 治疗指数低的药物 | 静脉滴注给药 |
| | 治疗指数高的药物 | 可分次给药，但维持量要随给药间隔时间的延长而增大 |
| 30 分钟~8 小时 | 治疗指数低的药物 | 每个半衰期给药 1 次，也可静脉滴注给药 |
| | 治疗指数高的药物 | 可每 1~3 个半衰期给药 1 次 |
| 8~24 小时 | 每个半衰期给药 1 次； 如果需要立即达到稳态，可首剂加倍 | |
| 大于 24 小时 | 每天给药 1 次； 如果需要立即达到治疗浓度，可首剂加倍 | |

3. 【问题】各种不良反应考点是什么？

| | |
|-------|---|
| 副作用 | ①治疗量下出现的；②实例：阿托品 |
| 毒性作用 | 氨基糖苷类具有的耳毒性 |
| 首剂效应 | 哌唑嗪首剂低血压 |
| 过敏反应 | 青霉素过敏 |
| 特异质反应 | 特点“缺”某种酶 |
| 继发反应 | ①长期口服广谱抗生素继发二重感染； ②抗肿瘤药物导致继发感染 |
| 停药综合征 | ①长期应用糖皮质激素类药，停药后原疾病的复发； ②停用抗高血压药出现血压反跳、心悸、出汗 |
| 后遗效应 | ①指停药后，血药浓度已降至最低治疗水平以下时，遗留下来的生物学效应 |

②巴比妥类宿醉现象；氨基糖苷类引起的听力丧失；长期应用皮质激素后导致肾上腺分泌功能的减退



正保医学教育网
www.med66.com