


医学教育网执业中药师：《答疑周刊》2023年第7期

问题索引：

1. 【问题】老师，望舌色的总结有吗？
2. 【问题】老师，炙甘草和炙黄芪可以装于一斗或上下斗吗？
3. 【问题】老师，问疼痛的总结有吗？

具体解答：

1. 【问题】老师，望舌色的总结有吗？



[医学教育网原创]

2. 【问题】老师，炙甘草和炙黄芪可以装于一斗或上下斗吗？

不可以的，因为二者性状形似，但功效不同，故不宜装于同一斗或上下斗中。
有关斗谱编排的原则的总结如下：

编排原则	具体药物的编排
斗谱编排基本原则	高层——质地较轻且用量较少的药物，如月季花、白梅花与佛手花；玫瑰花、代代花与厚朴花；地骨皮、千年健与五加皮；络石藤、青风藤与海风藤；密蒙花、谷精草与木贼草等
	中上层——常用药物，便于调剂操作
	较下层——质地沉重的矿石、化石、贝壳类药物和易于造成污染的药

	<p>物（如炭药）。前者如磁石、赭石与紫石英；龙骨、龙齿与牡蛎；石决明、珍珠母与瓦楞子；石膏、寒水石与海蛤壳等。后者如藕节炭、茅根炭与地榆炭；大黄炭、黄芩炭与黄柏炭；艾炭、棕榈炭与蒲黄炭等</p>
	<p>最底层——质地松泡且用量较大的药物，如芦根与茅根；茵陈与金钱草；白花蛇舌草与半枝莲；灯心草与通草；竹茹与丝瓜络；薄荷与桑叶；荷叶与荷梗</p>
	<p>可同放于一个药斗的药物：同一处方中经常一起配伍应用的“药对”药物，如麻黄、桂枝；酸枣仁、远志；射干、北豆根；党参、黄芪；桃仁、红花；杜仲、续断；陈皮、青皮；泽泻、猪苓；山药、薏苡仁；板蓝根、大青叶；辛夷、苍耳子；火麻仁、郁李仁；羌活、独活；苍术、白术；麦冬、天冬；川乌、草乌；知母、浙贝母；蒲公英、紫花地丁；篇蓄、瞿麦；三棱、莪术；乳香、没药；小茴香、橘核</p>
<p>斗谱编排时还应参考的其他原则</p>	<p>属于配伍禁忌的药物，不能装于一斗或上下药斗中，如乌头类与半夏的各种炮制品、瓜蒌（瓜蒌皮、瓜蒌子、瓜蒌仁及天花粉）</p> <p>甘草与京大戟、甘遂、芫花；</p> <p>藜芦与丹参、南沙参、玄参、苦参、白芍、赤芍、细辛；</p> <p>丁香（包括母丁香）与郁金；</p> <p>芒硝（包括玄明粉）与京三棱；肉桂（官桂）与石脂均不宜放在一起（十八反、十九畏）</p> <p>外观性状相似但功效不同的饮片，不宜排列在一起，如蒲黄与海金沙，紫苏子与菟丝子，山药与天花粉，杏仁与桃仁，厚朴与海桐皮，荆芥与紫苏叶，大蓟与小蓟，炙甘草与炙黄芪，当归与独活，制南星与象贝（浙贝），菟丝子与苏子，熟地与黄精，知母与玉竹，蛇床子与地肤子、玫瑰花与月季花，血余炭与干漆炭，韭菜子与葱子等</p> <p>药名相近，但性味功效不同的饮片不应排列在一起。如附子与白附子，藜芦与漏芦，天葵子与冬葵子等</p> <p>来源于同一植物，入药部位不同导致功效不相同的饮片不能排列在一</p>

起。如麻黄与麻黄根
为防止灰尘污染，宜放在加盖的瓷罐中，保持清洁卫生的中药有熟地黄、龙眼肉、青黛、玄明粉、松花粉、生蒲黄、乳香面、没药面、儿茶面、血竭面
有恶劣气味的药物，不能与其他药物装于同一药斗中，如阿魏、鸡矢藤
贵细药品专柜存放的中药有牛黄、麝香、西红花、人参、西洋参、羚羊角、鹿茸、珍珠、冬虫夏草、海龙、海马
毒性中药和麻醉中药必须专柜、专锁、专账、专人管理

[医学教育网原创]

3. 【问题】老师，问疼痛的总结有吗？

性质	疼痛特点	临床意义
胀痛	疼痛伴有胀满或胸闷	气滞
重痛	疼痛伴有沉重感	湿邪困阻
刺痛	疼痛如针刺	血瘀
绞痛	疼痛如刀绞，疼痛剧烈难忍	心血瘀阻引起的真心痛； 蛔虫上窜引起的脘腹痛； 石淋引起的腰痛或小腹痛
灼痛	痛处灼热，喜凉	热证
冷痛	痛有冷感，喜暖	寒证
隐痛	疼痛并不剧烈，可以忍耐，却绵绵不休，持续时间较长	虚证
掣痛	抽掣或牵引而痛，多与肝病有关	筋脉失养，阻滞不通。肝主筋，故掣痛多与肝病有关

[医学教育网原创]